

Ordonnance bizona

Articles L.322-3,3° et 4°, L.342-1 et R.161-45 du Code de la sécurité sociale.

Docteur DINCUFF ELOÏSE
N° RPPS : 10101520863

Service de : MED CE CG

Identification de la structure

Centre Hospitalier du Haut Anjou
Quai Georges Lefevre
53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE
Tel : 02.43.09.33.33
N° FINESS 53 0 00002 5

Identification du patient

Monsieur Jean-Luc BOURNEUF

Date de naissance : 03/11/1960

N° Sécurité Sociale 160117226430713

PHARMACIE DE MIRÉ

7, av. du Haut Anjou - 49330 MIRÉ

Tél : 02 41 32 80 97

492 014 899

Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)

(AFFECTION EXONERANTE)

- **TIORFAN 100 MG, GÉLULE** par Voie ORALE, pendant 30 jours
En cas de diarrhée : prendre 1 gélule après la première selle liquide, puis 1 gélule au moment des repas - maximum 4 gélules par jour
- **SMECTA 3 G, PDR PR SUSP BUV, SACHET** par Voie ORALE
1 sachet Matin - 1 sachet Midi - 1 sachet Soir pendant 30 jours en cas de diarrhée
- **EMEND 125 MG & 80 MG, GÉLULE** par Voie ORALE pendant 3 jours
EMEND 125 : au départ du domicile avant les cures de chimiothérapie
EMEND 80 : à 8 heures pendant les 2 jours suivant les cures de chimiothérapie
Pour 6 fois
MÉDICAMENT D'EXCEPTION ORDONNANCE SPECIFIQUE JOINTE
- **PRIMPERAN 10 MG, CPR** par Voie ORALE
1 comprimé Matin - 1 comprimé Midi - 1 comprimé Soir pendant 3 à 5 jours après les cures de chimiothérapie
Pour 6 fois
- **EMLA PATCH 5%, DISPOSITIF CUTANÉ** par Voie CUT
Avant chaque cure de chimiothérapie : coller un patch sur le site avant de quitter le domicile 3 ↓ 3
Pour 6 fois
- **SODIUM BICARBONATE 1.4% B BRAUN, SOL PR PERF, FLAC VERRE 500 ML** par Voie ORALE
Pendant 6 mois
Faire 4 à 6 bains de bouche par jour, de 3 à 4 min chacun, puis recracher 1 + 1 + 1
En dehors des repas
Faire un bain de bouche pour rinçage après brossage des dents
- **DEXERYL, CRÈME, TUBE 250 G** par Voie CUT
1 application à 8h - 1 application à 20h pendant 30 jours
A appliquer sur les zones cutanées sèches

Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)